

Interceptiv tandregleringsvård

Med interceptiv tandregleringsvård avses aktiva ingrepp i tidigt skede med begränsade insatser för att styra bettutvecklingen i gynnsam riktning. Interceptiv tandregleringsvård ingår i fullständig allmäntandvård. Det ankommer på patientansvarig allmäntandläkare att tillse att vården utförs.

I den interceptiva vården ingår bland annat:

- information
- extraktion, frenulumplastik
- inslipning, cross-elastic, plåt eller Quad-Helix för hävande av tvångsförande transversella avvikelser och/eller platsberedning
- behandling med spatel, plåt eller cross-elastic för hävande av frontala inverteringar
- platskontroll ("platshållare") med lingualbåge eller transpalatinal bar och/eller behandling av ogynnsam påverkan av tunga, läpp och/eller ovanor.

Konsulterande urvalstandläkaren avgör vid visningstillfället om vården är av interceptiv karaktär, vad som och hur denna ska utföras. Vården kan utföras av patientansvarig allmäntandläkare, annan erfaren tandläkare eller tandregleringsspecialist. De två sist nämnda utan skyldighet för Vårdgivaren att handleda.

Följande interceptiva tandregleringsvård är ersättningsberättigad:

a) *Interceptiv check 1* omfattas av avtagbar apparatur för expansionsbehandling, fast apparatur, exempelvis Quad-Helix, lingualbågar eller liknande.

b) *Interceptiv check 2* omfattas av övrig avtagbar apparatur.

Ersättningen inkluderar kostnad för tandteknik.

Vårdgivaren har möjlighet att rekommendera patienten att söka interceptiv vård vid utbildningsinstitutioner, företrädesvis vid institutionen för odontologi vid Karolinska Institutet samt vid Eastmaninstitutet, om där finns behov av denna vård för utbildningsändamål.