

## Behandling av hepatit C

Tänk på de nu förbättrade möjligheterna till behandling/bot vid hepatit C! ALLA patienter med hepatit C (HCV-RNA-/HCV-Ag positiva) bör remitteras till infektions- eller gastromedicinsk klinik för ställningstagande till behandling, till exempel till Infektionsmottagningarna vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge eller Danderyds sjukhus. Även patienter med ett pågående injektionsmissbruk är välkomna till IMB-mottagningen (infektion-missbruk-beroende) på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge (I53). **Dessutom behandlar Sprututbytet och flera LARO-mottagningar idag sina egna patienter. Barn med hepatit C remitteras till barnkliniken Karolinska Universitetssjukhuset.**

Under år 2014 kom flera nya hepatit C-läkemedel, och numera kan >95 % av patienter med hepatit C läka ut med enbart tablettbehandling under ca 2-3 månader. Förutom bättre effekt har den nya behandlingen också mycket färre biverkningar än den tidigare behandlingen med interferonsprutor. Detta gör att patienter som hade kontraindikationer mot den tidigare behandlingen, till exempel på grund av psykisk sjukdom, nu ofta är möjliga att behandla. Initialt prioriterades patienter med skrumplever eller förstadiet till skrumplever (stadium F3-F4) för behandling. Från och med juli 2015 vidgades behandlingsrekommendationen till att även omfatta dem med måttlig ärrbildning/fibros på levern (stadium F2). I januari 2018 kom nationella rekommendationer att även personer med ingen eller obetydlig ärrbildning (F0-F1) bör erbjudas behandling. Numera erbjuds alltså hepatit C behandling oavsett fibrosstadium, och de flesta personer med hepatit C kommer att kunna bli botade från sin hepatit.