

PROVTAGNINGSMALL: ANMÄLNINGSPLIKTIGA SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER (STI)

Rekommenderad provtagning utifrån anamnes

Prioriteringsgrad för provtagning: ● = Hög ● = Medel, överväg provtagning efter noggrann anamnes ○ = Låg

version: 20191212

STI	KLAMYDIA	GONORRÉ	HEPATIT B	HEPATIT C	HIV	SYFILIS	KOMMENTAR
Tidigaste tid för provtagning efter smittfall (tidigare om symtom). I de fall två tidsangivelser finns behöver det längre tidsintervallet ha förlutit innan slutprov tas.	7 dagar	7 dagar	2 resp. 6 månader	2 resp. 3 månader	2 veckor resp. 6 veckor Hivtest med snabbsvar 8 veckor	4 veckor resp. 3 månader	Noggrann anamnes och provtagning enligt sexuell praktik. Ta prov från t. ex urin, vagina, cervix, svalg, rektum
SYM TOM Har/haft urinvägsbesvär	●	●					Ev. urinodling/urinsticka
Har/haft flytningar	●	●					
Har/haft mellanblödningar	●	●					
Har/haft blödning i samband med samlag	●	●					
Har/haft ont nedtill i buken/underlivet	●	●					
Har sår, utslag, blåsor, klåda eller smärta i underlivet?	●	○			●	●	Syfilissår kan också förekomma oralt
Har svullna lymfkörtlar	●				●	●	
Har ögonbesvär/ensidig konjunktivit	●	●					Prov tas från konjunktiva. Remittera ev. till ögonmott.
Har inom de senaste 12 månaderna haft vaginalt, oralt eller analt sex med ny partner	●	●	○		●	●	
Har/haft MSM* kontakter	●	●	●	●	●	●	Tänk på att hepatit A kan överföras sexuellt
Har haft sex utomlands	●	●	●		●	●	Sjukdomar har olika förekomst i olika länder
Anmälnings- och smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen	Ja	Ja Vid positivt prov ska patient remitteras direkt till Sesam/Venhälsan för fortsatt provtagning, behandling och uppföljning	Ja Vid positivt prov ska patient remitteras till infektionsklinik	Ja Vid positivt prov ska patient remitteras till infektionsklinik för behandling	Ja Vid positivt prov, ta direktkontakt (via telefon) med infektionsklinik	Ja Vid positivt prov ska patient remitteras direkt till Sesam/Venhälsan för fortsatt provtagning, behandling och uppföljning	Om ja, är undersökning, provtagning och behandling gratis för patienten Läs mer: smittskyddstockholm.se ► Sjukdomar A-Ö
Behandling/postexpositionsprofylax	Doxycylin Vid graviditet, se Läkemedelsverkets rekommendation		Ev. postexp.profylax påbörjas helst inom 12 tim.		Ev. postexp.profylax ordinerar av inf.läkare efter individuell bedömn. inom 2 tim (senast 36 tim)		Läs mer: vardgivarguiden.se ► Behandlingsstöd ► Hälsöfrämjande arbete ► Sexuell hälsa ► Sesampärmen
Annat Patient som önskar provtagning ska ej nekast!	Kontrollprov efter behandling enbart för gravida. Vid klamydia anal, regionala lymfkörtlar och anala besvär, tänk på LGV (Lymfogranuloma venereum). Kontakta Sesam/Venhälsan.		I Stockholms län erbjuds kostnadsfri vaccination mot hepatit A och B till MSM och till personer som injicerar Läs mer: smittskyddstockholm.se ► Sjukdomar A-Ö ► Hepatit B			Vid misstänkt primärsår/ fortsatt misstanke, kontakta Sesam/Venhälsan	Diagnostik av ej anmälningspliktiga STI (t ex genital mykoplasma, kondylom och herpes) kan också behövas, beroende på symtom och statusfynd. Läs mer: viss.nu

*MSM = män som har sex med män