

**Ändring:**

Version 6.0: Tillägg om arbete utanför kohort har gjorts. Texten har justerats. Länk har lagts till.

## Covid-kohort vid flera fall i slutenvård

### Patienter med bekräftad covid-19

- Flera patienter med bekräftad covid-19 kan vårdas tillsammans i en covid-kohort och dela vårdrum, hygienutrymme och personal.
- Covid-kohorten förutsätter att inte annan risk för smittspridning föreligger inom kohorten t ex bärarskap av MRSA, VRE och ESBLcarba eller infektion av calicivirus.

### Basala hygienrutiner och personlig skyddsutrustning

- Följ alltid basala hygienrutiner.
- Använd personlig skyddsutrustning enligt [Omhändertagande av patient vid misstänkt eller bekräftad covid-19](#)
- Byt plastförkläde och handskar mellan patienter inom kohorten, i de fall som plastförkläde och handskar använts.
- Vid risk för kraftig nedsmutsning kan långärmat plastförkläde användas.
- Använd visir/skyddsglasögon och vätskeresistent munskydd IIR. Visir/skyddsglasögon behöver inte bytas mellan patienterna i kohorten, så länge det inte blivit synligt smutsigt eller tagits av.
- Använd andningsskydd (FFP2/N95 eller FFP3) vid [Aerosolgenererande arbetsmoment](#).
- Personal som varit i covid-kohorten kan vårda andra patienter utanför kohorten. Munskydd och visir tas då av före arbete utanför kohorten och ny skyddsutrustning tas på vid behov.

### Patient med symtom på misstänkt covid-19 infektion

- Patient med symtom på misstänkt covid-19 infektion provtas enligt gällande provtagningskriterier och vårdas i enkelrum med stängd dörr fram till provsvar. De ska inte ingå i covid-kohorten.

### Exponerad patient utan symtom

- Exponerad patient utan symtom ska inte ingå i covid-kohorten.

Dokumentets namn: Kohortvård vid covid-19 i slutenvård	Dokument nr: STÖ054(E)	Version nr: 6.0	Denna version fastställd: 2022-03-09	Första version fastställd: 2020-03-16
Utarbetat av: Vårdhygien Stockholm	Godkänt av: Rebecca Lundholm Krig	Nästa revision: 2023-03-09	Sida 1 (1)	