

Akut kirurgi



BEHANDLINGSPROGRAM
2017

Glasgow Coma Scale

Glasgow Coma Scale

Ögonöppning:

Respons	Poäng
Spontan	4
På tilltal	3
Vid smärta	2
Ingen respons	1

a

Motorisk reaktion:

Respons	Poäng
På uppmaning	6
Lokaliserar smärtan	5
Drar undan	4
Flektion	3
Extension	2
Ingen	1

b

Verbal reaktion:

Respons	Poäng
Orienterad	5
Desorienterad	4
Osammanhängande ord	3
Obegripliga ljud	2
Ingen	1

c

302 Appendix

Canadian C-spine Rule

A. Grundkrav

- Vuxen > 15 år gammal
- Ingen anamnes på rygg-/kotsjukdom
- GCS 15 (normal medvetandegrad)
- Skada < 48 tim ålder

B1. Ingen högriskfaktor såsom

- Ålder > 65 år
- Allvarlig skademekanism såsom
 - fall från > 1 meter/5 trappsteg
 - axiellt våld mot huvudet t.ex. dykning
 - trafikolycka med hög hastighet (100 km/h, voltat, utslungad ur fordon) cykelolycka
 - motoriserat fritidsfordon (ex snöskoter, terrängfordon m.m.)
- Parestesier i extremiteterna

B2. Lågriskfaktor föreligger

- Enkel påkörning bakifrån, undantaget
 - krockad in i mötande trafik
 - påkörd av buss/lastbil
 - voltat med fordonet
 - påkörd av fordon med hög hastighet
- Sittande ställning på akutmottagningen
- Vid något tillfälle varit uppegående efter olyckan
- Fördröjd debut av nacksmärta
- Frånvaro av ömhet i nackens medellinje

B3. Kan aktivt rotera nacken (45 grader åt höger respektive vänster)

Patient som uppfyller grundkraven (A), saknar högriskfaktor (B1), har någon lågriskfaktor (B2) och kan rotera nacken aktivt (B3) kan frias från skada.

Nexus

- Avsaknad av ömhet/smärta i medellinjen
- Avsaknad av fokala neurologiska bortfallssymtom
- Ingen intoxication
- Normal medvetandegrad
- Avsaknad av smärtsam distraherande skada.

Patient som uppfyller dessa krav kan frias från halsryggsskada.

Tabell 1. Förslag till suturmaterial, tjocklek och tid till suturtagning

Region	Hud	Djupare struktur	Dagar till suturtagning
Skalpen	5–0/4–0/3–0 monofilament	4–0 resorberbar	7–10
Ansikte, inklusive öra	6–0/5–0 monofilament	5–0 resorberbar	5–7
Munslemhinna		5–0 resorberbar	
Bålen	4–0/3–0 monofilament	3–0 resorberbar	Ventralt 8–10 Rygg 14
Extremiteter	4–0 monofilament	4–0 resorberbar	8–10*
Hand	5–0 monofilament	5–0 resorberbar	Hand 8–10* Fingertopp 10–12
Fot och fotsula	4–0/3–0 monofilament	4–0 resorberbar	12–14
Skrotum		5–0 resorberbar	

**lägg till 2–3 dagar vid sår över extensionsytor på leder*

Tabell 2. Indikationsförslag för alternativ förslutning

Limning	Stapling	Tejpning
Färska sårskador Lättapproximerade sårkanter utan större spänning Raka och rena sårkanter utan diastas	Linjära raka sår på skalp, bål och extremiteter Temporär, hastig förslutning av sår där patienten behöver omedelbar operation p.g.a. livshotande trauma	Ytliga, raka sår utan större spänning Hudflikar där suturering är kontraindicerat p.g.a. hotande ischemi Sår med stor infektionsrisk Sår hos äldre och kortisonbehandlade Support efter suturtagning